


乳歯や生えだての永久歯は歯の質がやわらかいため、むし歯のリスクが高いのが特徴です。一度むし歯になると進行が早く、気付いたころには穴が大きくなっていることがよくあります。

また、子どもの歯科治療は治療自体が困難な場合が多いため、「むし歯になったら歯医者に行く」のではなく「むし歯にならないように歯医者に行く」ことでむし歯を予防しましょう。

## ママごはん デンタルクリニック

《第46回》  
むし歯の治療  
～むし歯の程度と  
治療の種類～

### むし歯の程度



CO (シーオー)


むし歯はその大きさによりC1～C4に分けられます。またC1になる前の穴があといていない初期のむし歯をCO (シーオー) と言います。COは定期的なフッ化物歯面塗布、フッ化物洗口、適切な歯みがきなどでむし歯の進行を抑えることができます。



### 治療の種類

#### C1／エナメル質のむし歯とC2／象牙質まで達したむし歯

C1、C2についてはむし歯の部分を取りプラスチックで詰めます。範囲が大きい場合は型取りをして金属を詰める場合もあります。まだ治療ができない子どもの場合、応急的にむし歯の進行を遅らせる薬をつける場合もあります。



#### C3／歯髄まで達したむし歯

C3はむし歯が歯の神経まで達した状態で強い痛みが出やすくなります。そのため麻酔をして神経をとる治療を行います。

#### C4／歯の頭の部分がなくなった状態

C4は歯の頭の部分が崩壊し根っこのみ残った状態です。症状がなければそのまま永久歯への自然交換を待つ場合もありますが、状態次第で抜歯を行うこともあります。

むし歯予防・  
早期発見のために、  
定期的な健診を!



協力／三重県歯科医師会

〒514-0003 津市桜橋2丁目120番地の2 ☎059-227-6488 (代)

<http://www.dental-mie.or.jp>



日本歯科医師会  
PR キャラクター よ坊さん(三重県)